


chapter 4

d व f ब्लॉक के तत्व — d-block

वे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम e^- d-उपकोश में उपस्थित रहते हैं, उन्हें d-ब्लॉक के तत्व कहा जाता है।



d-block के तत्वों की 4 श्रेणियां



1.	प्रथम संक्रमण श्रेणी (3d-श्रेणी)	[Sc - Zn]
2.	द्वितीय (4d-श्रेणी)	[Y - Cd]
3.	तृतीय (5d-श्रेणी)	[La - Hg]
4.	चतुर्थ (6d-श्रेणी)	[Ac - ...]

संक्रमण धातुएं

वे तत्व जिनके अंतिम d-कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।





Note: Zn, Cd व Hg संक्रमण धातुएं नहीं हैं क्योंकि इनके अंतिम d-कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाये जाते हैं।



अयुग्मित e^- नहीं है

अपवाद (Exceptions) & संक्रमण धातुओं के गुण

अपवाद (Cr & Cu)



इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अयुग्मित e^- हो तो यह संक्रमण धातु कहते हैं।

संक्रमण धातुओं के गुण

- 1. अधिकतर कठोर होती हैं।
- 2. गलनांक अधिक होते हैं।
(सबसे अधिक गलनांक वाली धातु → टंगस्टन (W) 3500°C)
- 3. आयन रंगीन होते हैं (Except Cu^+ which is रंगहीन, Cu^{2+} is नीला)।
- 4. आयन अनुचुम्बकीय होते हैं।
- 5. परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
- 6. उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं।

चुम्बकीय गुण

$$\text{चुम्बकीय आघूर्ण } (\mu) = \sqrt{n(n+2)} \text{ B.M (बोहर मैग्नेटोन)}$$

(यहाँ n = अयुग्मित e^- की संख्या)



$$\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.9 \text{ B.M.} \checkmark$$

$\mu = 0 \rightarrow$ प्रतिचुम्बकीय (चुम्बकीय क्षेत्र से दूर जाना)

$\mu \neq 0 \rightarrow$ अनुचुम्बकीय (चुम्बकीय क्षेत्र की ओर जाना)

धात्विक बंध

संक्रमण धातुएं धात्विक बंध (मजबूत बंध) बनाने की क्षमता रखती हैं क्योंकि इनके अंतिम d-कक्षक में अयुग्मित e^- होते हैं।

संक्रमण धातुओं के द्वारा धात्विक बंध बनाने के कारण निम्न लक्षण होते हैं:


- (1) कठोरता (सबसे कठोर धातु: Cr)
- (2) उच्च गलनांक (टंगस्टन W: 3500°C)
- (3) उच्च कणन एन्थैल्पी (कणों को अलग-अलग करना मुश्किल)

ऑक्सीकरण संख्या (Oxidation States)


K: +1, Na: +1, Ca: +2
F: -1, O: -2, Cl: -1



$$+1 + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow \boxed{x = +7}$$



$$2x + 5(-2) = 0 \Rightarrow 2x = +10 \Rightarrow \boxed{x = +5}$$



$$2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow 2 + 2x - 14 = 0 \Rightarrow \boxed{x = +6}$$




$$x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x - 8 = -2 \Rightarrow \boxed{x = +6}$$



$$x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x - 8 = -1 \Rightarrow \boxed{x = +7}$$

Note: संक्रमण धातु ऑक्सीजन व/या फ्लोरीन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण संख्याएँ प्रदर्शित करता है क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं जो संक्रमण धातु से e^- खींचकर उन्हें धनावेशित कर देते हैं।




- किसी यौगिक में संक्रमण धातु पर जितना अधिक धनावेश होता है, उतना ही वह यौगिक अम्लीय होता है।



उत्प्रेरकीय गुण

परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या + अधिक सतह क्षेत्रफल $\longrightarrow$ उत्प्रेरक गुण



परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या



Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
+3	+2	+2	+2	+2	+2, +3	+2, +3	+1, +2	+1, +2	+2
	+3	+3	+3	+3					
	+4	+4	+4	+4					
		+5	+5	+5					
			+6	+6					
				+7					

अधिकतम संख्या

सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था:
Os $\longrightarrow$ +8 (ओसमियम)


परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius Trends)

3d श्रेणी (Sc - Zn) में बायें से दायें जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्रम एकसमान नहीं होता है: पहले घटती है → फिर एक जैसी रहती है → तत्पश्चात बढ़ती है।




स्थायित्वता (Stability)


संक्रमण धातुओं के आयन d^0 , d^5 , व d^{10} विन्यास पर स्थायी हो जाते हैं।



d^0 (खाली कक्षक) - स्थायी



d^5 (अर्धपूर्ण) - स्थायी



d^{10} (पूर्ण) - स्थायी

} स्थायी

$Mn \rightarrow Mn^{2+} (4s^0 3d^5) \rightarrow$ यह स्थायी है।

$Fe \rightarrow Fe^{2+} (4s^0 3d^6) \rightarrow$ यह अस्थायी है।

अपचायक व ऑक्सीकारक

आयन $\rightarrow (-e^-) \rightarrow$ आयन (स्थायी) $\Rightarrow$ अपचायक (Reducing Agent)

आयन $\rightarrow (+e^-) \rightarrow$ आयन (स्थायी) $\Rightarrow$ ऑक्सीकारक (Oxidizing Agent)

Q: Fe^{2+} व Mn^{2+} में कौन अपचायक की तरह कार्य करेगा?


$Fe^{2+} (3d^6) \rightarrow (-1e^-) \rightarrow Fe^{3+} (3d^5)$ । Fe^{2+} स्थाई विन्यास d^5 बनाने के लिए e^- निकालता है, अतः यह अपचायक है।

$Mn^{2+} (4s^0 3d^5) \rightarrow$ यह पहले से ही d^5 स्थायी विन्यास में है, अतः यह अपचायक नहीं है।

अंतराकाशी यौगिक व मिश्रधातु

अंतराकाशी यौगिक


संक्रमण धातु के जालक (Lattice) में रिक्त स्थान में छोटे परमाणु (H, C, N) प्रवेश करके यौगिक बनाते हैं।



Examples: ZnH, TiH


मिश्रधातु

संक्रमण धातुएं मिश्रधातु बनाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के आकार लगभग एक समान होते हैं।



1. पीतल (Brass) = Cu + Zn
2. कांस्य (Bronze) = Cu + Sn
3. स्टेनलेस स्टील = Fe + Cr + Ni + C (अल्प मात्रा)
4. नाइक्रोम (Nichrome) = Fe + Cr + Ni (हीटर की स्प्रिंग)

KMnO₄ (पोटैशियम परमैंगनेट) बनाने की विधि व गुण



रासायनिक गुण

KMnO₄ तीनों माध्यम (अम्लीय, क्षारीय, उदासीन) में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है।



अम्लीय माध्यम (Acidic Medium) में:

- Fe²⁺ को Fe³⁺ में: $[\text{MnO}_4^- + \text{H}^+ + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{Fe}^{3+}]$
- I⁻ को I₂ में: $[\text{MnO}_4^- + \text{I}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}]$

उपयोग: जल के शुद्धिकरण में, आयनात्मक विश्लेषण में



$K_2Cr_2O_7$ (पोटैशियम डाइक्रोमेट) बनाने की विधि व गुण

क्रोमाइट अयस्क ($FeCr_2O_4$)



रासायनिक गुण

केवल अम्लीय माध्यम (H^+) में ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है।



f-block के तत्व (आंतरिक संक्रमण तत्व)

वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन f-उपकोश में उपस्थित होते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं।

$[_{57}\text{La}]$ ————— 4f श्रेणी (लैन्थेनाइड) $\longrightarrow$ $[_{71}\text{Lu}]$

$[_{89}\text{Ac}]$ ————— 5f श्रेणी (एक्टिनाइड) $\longrightarrow$ $[_{103}\text{Lr}]$

समानताएं (Similarities)


लैन्थेनाइड (4f श्रेणी)

- ✓ 1. f-ब्लॉक के तत्व हैं (आंतरिक संक्रमण तत्व)।
- ✓ 2. ये क्रियाशील कठोर ठोस धातुएं हैं।
- 3. ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।

एक्टिनाइड (5f श्रेणी)

- 1. f-ब्लॉक के तत्व हैं (आंतरिक संक्रमण तत्व)।
- 2. ये क्रियाशील कठोर धातुएं हैं।
- 3. ये परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (f-block)




सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (लैन्थेनाइड - 4f)

- La (57) $\rightarrow [Xe] 4f^0 5d^1 6s^2$
- Ce (58) $\rightarrow [Xe] 4f^1 5d^1 6s^2$
- Gd (64) $\rightarrow [Xe] 4f^7 5d^1 6s^2$ अर्धपूर्ण स्थायी
- Lu (71) $\rightarrow [Xe] 4f^{14} 5d^1 6s^2$ पूर्ण स्थायी

आयनों का विन्यास



स्थायी





स्थायी

लैन्थेनाइड संकुचन (Lanthanide Contraction)

f^0, f^7, f^{14} विन्यास स्थायी होता है।
 $Ce^{4+} \rightarrow f^0$ (स्थायी) ✓
 $Eu^{2+} \rightarrow 4f^7$ (स्थायी) ✓

परिभाषा
लैन्थेनाइड श्रेणी में बायें से दायें जाने पर परमाणु आकार धीरे-धीरे कम होता है, जिसे लैन्थेनाइड संकुचन कहते हैं।

कारण
 f -कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव (Poor shielding effect)।



अनुप्रयोग

- 1. परमाणु आकार की जानकारी ($Zr \approx Hf$ समान आकार)
- 2. क्षारीय शक्ति का स्पष्टीकरण

लैन्थेनाइड	एक्टिनाइड
	एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीकरण संख्या (+2 to +7) दर्शाते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं, और अधिक क्रियाशील होते हैं।

Important Questions - Part 1

Q1: एक संक्रमण तत्व बताइये।

→ टाइटेनियम (Ti)

Q2: एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है?

→ थोरियम (Th)

Q3: ल्यूटेशियम (Lu) है?



→ एक लैन्थेनाइड

Q4: KMnO_4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या?

$$1 + x + 4(-2) = 0$$



$$\Rightarrow \boxed{x = +7}$$

Q5: किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? Fe^{3+} या Fe?



Answer: Fe^{3+}

Q6: Cu^{2+} ($Z=29$) आयन में अयुग्मित e^- की संख्या?



↓
अयुग्मित e^- ($n=1$)

Important Questions - Part 2

Q7: क्रोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र है?

→ FeCr_2O_4

Q8: मुद्रा धातु (Coinage metals) किसे कहा जाता है?

→ $\text{Fe}, \text{Co}, \text{Ni}$

Q9: लैन्थेनाइड क्या कहलाते हैं?

→ f-ब्लॉक के तत्व (आंतरिक संक्रमण तत्व)

Q10/Q11: Cu^{2+} का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है?

→ $[\text{Ar}] 3d^9$ । यह अनुचुम्बकीय (Paramagnetic) है।

Q12: निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? ($\text{Ni}, \text{Sc}, \text{Ti}, \text{V}, \text{Cr}, \text{Mn}, \text{Fe}, \text{Co}, \text{Cu}, \text{Zn}$)

$\text{Sc}, \text{Ti}, \text{V}, \text{Cr}, \text{Mn}, \text{Fe}, \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}, \text{Zn}$ → Note: Zn संक्रमण धातु नहीं है

Q13: निम्न में से किसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है?

→ $\text{Mn}(25), +7$

Subject Complete ✓